

# Mantenimento



**CONCIME MINERALE COMPOSTO**  
**Concime NPK(MgO)con ricoprente ottenuto**  
**per miscelazione**  
**15-6-19 (2)**  
**a basso tenore di cloro**

<b>Azoto(N)totale</b>	<b>16%</b>
Azoto(N)nitrico	5,2%
Azoto(N)ammoniacale	4,5%
Azoto(N)ureico	5,3%
<b>Anidride fosforica(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	<b>6,0%</b>
Anidride fosforica(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )solubile in acqua	5,5%
<b>Ossido di potassio(K<sub>2</sub>O)</b>	
solubile in acqua basso tenore di cloro	<b>19%</b>
Ossido di magnesio(MgO)solubile in acqua	2,0%

I concimi a cessione programmata sono composti da elementi nutritivi di elevata qualità in forma granulata, Alcuni degli elementi sono incapsulati da una speciale membrana polimerica biodegradabile. Non appena il granulo entra in contatto con il terreno od il substrato e trova un minimo livello d'umidità, inizia ad assorbire il vapore acqueo attraverso i microfoni della membrana. L'umidità dissolve gradualmente il concime contenuto all'interno che inizia a diffondersi regolarmente nella zona d'assorbimento radicale..

La cessione dipende unicamente dalla temperatura media del terreno e non è influenzata in modo significativo dal tipo di terreno, dal pH o dalla carica microbiologica

## CARATTERISTICHE

**GIARDINO&ORTO MANTENIMENTO** è un concime a cessione controllata (35% del Azoto) massima efficacia della nutrizione azotata per uno sviluppo bilanciato. Potassio nella forma più pura, da nitrato facilmente assimilabile da tutte le colture. Apporto di tutti gli elementi nutritivi e basso tenore di cloro. Agente ricoprente MCT. Percentuale del prodotto ricoperto 15% (in peso) Membrana di ricopertura MCT contemplata nel Dlgs 75/2010 tra i prodotti ad azione specifica con azione sul concime.

## USO E DOSI

### Tappeto erboso:

Alcuni trattamenti durante la stagione 25-40 g/mq

### Colture orticole

Dopo la fioritura o la rincalzatura 400-600 g/10 mq

### Fragole

dopo la fioritura 400-500 g/10 mq

### Fruttiferi ( Melo, Pero, Pesco, Actinidia )

Prima degli stress termici 500-700 g/10mq  
 ( estivo - invernale )

### Piante ornamentali

Piante a dimora prima degli stress termici 10-150 g/pianta  
 ( estivo - invernale )

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche. Richiedete la scheda completa. Elenco completo utilizzando il code QR.

Questo formulato fa parte di una serie di prodotti di ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle alberature ,dell'orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Distribuito da:



[www.enviraweb.com](http://www.enviraweb.com)

**FoodLand Concimi**  
 Tappeto erboso 25-40 g/mq  
**Giardino&Orto**  
 SPECIALITA' NUTRITIVA  
 Gestione del tappeto erboso degli ortaggi e delle piante  
**Mantenimento**  
 3 kg

**CARATTERISTICHE**  
 GRANULAZIONE MANIPOLABILE a 100 micron e cessione controllata con un'efficienza elevata per una migliore gestione del concime. Azione a cessione programmata e ricoprente MCT. Azione a cessione programmata e ricoprente MCT. Azione a cessione programmata e ricoprente MCT. Azione a cessione programmata e ricoprente MCT.

**Fabbricante e distributore:**  
 ENVIRA srl  
 Via Duomo 8 A 15122  
 San Giuliano Nuovo  
 Alessandria

**Confezioni:**  
**PESO NETTO 6 l pari a 7,62 kg**

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE  
 NELL'AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO  
 CON GLI OCCHI E LA PELLE

